
Informacija za bolnika - izolirana perfuzija uda

IZOLIRANA PERFUZIJA UDA

Pozdravljeni!

Vaš zdravnik vam je predlagal poseg, imenovan izolirana perfuzija uda (*angl.* isolated limb perfusion, ILP). Poseg je najpogosteje namenjen zmanjševanju ali odpravljanju težav, nastalih zaradi kožnih zasevkov melanoma. Melanoma drugje v telesu poseg ne ozdravi. Uporablja pa se tudi za zdravljenje sarkomov roke ali noge.

ILP je kirurška metoda zdravljenja kožnih zasevkov melanoma (stadij III), ki so omejeni zgolj na roko ali nogo. Omogoča nam uporabo citostatika (zdravilo uporabljeno v kemoterapiji) zgolj na prizadeti okončini. Poseg izvedemo v splošni anesteziji. Večino bolnikov, ki potrebuje ILP, sprejmemo v bolnišnico za 7 dni.

Za to, da bi poseg uspešno izvedli, si moramo prikazati velike žile, ki roko ali nogo oskrbujejo s krvjo. Nato krvni obtok obolele okončine za nekaj časa osamimo od preostalega telesa s pomočjo aparata za zunajtelesni krvni obtok. Visok odmerek citostatika (melfalan, po potrebi pa tudi tumor nekrotizirajoči faktor alfa, TNF-alfa) vbrizgamo v arterijski del zunajtelesnega obtoka, ta namreč vodi v okončino, zdravilo pa skupaj s krvjo nato približno uro kroži po roki ali nogi. Okončino med posegom segrevamo, ob tem je namreč učinkovitost zdravila večja. Ker je uporaba citostatika omejena zgolj na roko ali nogo, ne pričakujemo stranskih učinkov, ki jih sicer povezujemo s kemoterapijo oz. ob uporabi visokih odmerkov zdravil (slabost, bruhanje ...).

Po posegu bodo sestre in zdravniki skrbno spremljali vaše počutje. Prve tri dni boste počivali z nekoliko privzdignjeno nogo ali podloženo roko, saj to olajša prekrvavitev in zmanjša oteklino okončine. Če se bo kirurg odločil in vam svetoval tako počivati tudi doma, boste o tem obveščeni. Poleg tega bomo spremljali vaš krvni tlak, prekrvavitev okončine in delovanje ledvic.

STRANSKI UČINKI ILP

Stranski učinki ILP so omejeni na zdravljeno nogo ali roko in izzvenijo v tednih po posegu. O vseh opaženih spremembah obvestite svojega kirurga.

Najpogostejši stranski učinki so:

- Bolečina v predelu pooperativne rane
- Rdečina v predelu pooperativne rane
- Boleča in nekoliko otrdela okončina
- Oteklina in rdečina okončine
- Kožni mehurji in luščenje kože
- Izguba dlačic
- Krhki, lomljivi nohti
- Občutek otrplosti ali mravljinčenje okončine
- Oteklina zaradi kopičenja limfe v okončini, lifedem

Stranski učinki so večinoma blago ali srednje močno izraženi, zelo redko pa so tako izraziti, da je potreben ponovni kirurški poseg.



PO ODPUSTU

Po odpustu iz bolnice boste prejeli navodila za oskrbo doma in datum pregleda pri lečečem kirurgu. Učinek zdravljenja boste po posegu opazili šele čez čas. Prve spremembe zasevkov melanoma so običajno vidne po šestih tednih, lahko pa boste še mesece po posegu opazili zmanjševanje oziroma izginjanje kožnih sprememb.

VIRI

<http://www.macmillan.org.uk/>

<https://www.aimatmelanoma.org>